


Олимпиада «Физтех» по физике,  
февраль 2023

Вариант 10-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.




4. Тепловой двигатель работает по циклу 1-2-3-1. Рабочее вещество – один моль одноатомного идеального газа. Для вычисления КПД цикла ученик десятого класса построил график зависимости молярной теплоемкости  $C$  газа (в единицах универсальной газовой постоянной  $R$ ) от температуры в процессах: 1-2, 2-3, 3-1 (см. рис.). Температура газа в состоянии 1  $T_1 = 400$  К, универсальная газовая постоянная  $R = 8,31$  Дж/(моль·К).



1) Найдите работу  $A_{12}$  газа в процессе 1-2.

2) Найдите КПД  $\eta$  цикла.

3) Постройте график цикла в координатах  $(P/P_1, V/V_1)$ , где  $P_1$  и  $V_1$  давление и объём в состоянии 1. Для построения графика перенесите шаблон (см. ниже) в чистовик своей работы. Точка 1 на графике соответствует состоянию 1 газа в цикле.




5. Четыре заряженных шарика связаны легкими нерастяжимыми нитями так, что шарики находятся в вершинах квадрата со стороной  $b$  (см. рис.). Масса каждого шарика  $m$ , заряд  $q$ .

1) Найдите силу  $T$  натяжения нитей.

Одну нить пережигают.

2) Найдите скорость  $V$  любого, выбранного Вами шарика, в тот момент, когда шарики будут находиться на одной прямой.

3) На каком расстоянии  $d$  от точки старта будет находиться в этот момент любой из двух шариков, изначально расположенных сверху (на рисунке)?



Коэффициент пропорциональности в законе Кулона  $k$ . Действие сил тяжести считайте пренебрежимо малым.



Олимпиада «Физтех» по физике,  
февраль 2023

Вариант 10-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



1. Мяч, посланный теннисистом вертикально вверх, поднимается на максимальную высоту за  $T = 2$  с.


1) Найдите начальную скорость  $V_0$  мяча.

2) Теннисист посылает мяч с начальной скоростью  $V_0$  под различными углами к горизонту в направлении высокой вертикальной стенки, находящейся на расстоянии  $S = 20$  м от места броска. На какой максимальной высоте мяч ударяется о стенку?

Ускорение свободного падения  $g = 10$  м/с<sup>2</sup>. Мяч движется в плоскости перпендикулярной стенке. Сопротивление воздуха считайте пренебрежимо малым. Все высоты отсчитываются от точки старта.

2. Лента транспортера, предназначенного для подъема грузов, образует с горизонтальной плоскостью угол  $\alpha$  такой, что  $\sin \alpha = 0,8$  (см. рис.).

В первом опыте небольшую коробку ставят на покоящуюся ленту транспортера и сообщают коробке начальную скорость  $V_0 = 4$  м/с. Коэффициент трения скольжения коробки по ленте  $\mu = \frac{1}{3}$ . Движение коробки прямолинейное.



1) За какое время  $T$  после старта коробка пройдет в первом опыте путь  $S = 1$  м?

Во втором опыте коробку ставят на ленту транспортера, движущуюся со скоростью  $U = 2$  м/с, и сообщают коробке скорость  $V_0 = 4$  м/с.

2) На каком расстоянии  $L$  от точки старта скорость коробки во втором опыте будет равна  $U = 2$  м/с?

3) На какой высоте  $H$ , отсчитанной от точки старта, скорость коробки во втором опыте станет равной нулю? Ускорение свободного падения  $g = 10$  м/с<sup>2</sup>. Все кинематические величины измерены в лабораторной системе отсчета.

3. Санки дважды разгоняют из состояния покоя до одной и той же скорости  $V_0$  за одинаковое время.


В первом случае санки тянут, действуя постоянной по модулю силой, направленной под углом  $\alpha$  к горизонту (см. рис.).

Во втором случае такая же по модулю сила, приложенная к санкам, направлена горизонтально. После достижения скорости  $V_0$  действие внешней силы прекращается.

1) Найдите коэффициент  $\mu$  трения скольжения санок по горизонтальной поверхности.

2) Через какое время  $T$  после прекращения действия силы санки остановятся? Ускорение свободного падения  $g$ .

Санки находятся на горизонтальной поверхности. Движение санок прямолинейное.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

1) Пусть  $h$  — ~~максимальная~~ <sup>$\sqrt{1}$</sup>  высота, на которую подымае мяч,  $m$  — масса мяча. В высшей точке траектории мяч остановится.

По закону ~~сохранения~~ импульса,

$$mV_0 = mgT,$$

$$V_0 = gT,$$

$$V_0 = 10 \text{ м/с}^2 \cdot 2 \text{ с} = 20 \text{ м/с}.$$

2) Пусть дальность полёта мяча максимальна, если он запущен под углом  $45^\circ$  к горизонту. Она равна  $l = \frac{V_0^2 \sin(2 \cdot 45^\circ)}{2g} = \frac{V_0^2}{2g}$

$$l = \frac{(20 \text{ м/с})^2}{2 \cdot 10 \text{ м/с}^2} = 20 \text{ м}$$

Таким образом, мяч может удариться о стену только около земли — на высоте 0.

Ответ: 1) 20 м/с;

2) 0.


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№2  
На коробку действуют сила тяжести  $m\vec{g}$  ( $m$  — масса коробки), сила реакции опоры  $\vec{N}$  и сила трения  $\vec{F}_{\text{тр}}$ .  
Второй закон Ньютона в проекции на ось  $x$ :  
 $-F_{\text{тр}} - mg \sin \alpha = -ma$

Второй закон Ньютона в проекции на ось  $y$ :

$N - mg \cos \alpha = 0$  (так как коробка не движется вдоль оси  $y$ )

$$N = mg \cos \alpha$$

$$F_{\text{тр}} = \mu N = \mu mg \cos \alpha$$

$$\mu mg \cos \alpha + mg \sin \alpha = ma$$

$$a = g(\mu \cos \alpha + \sin \alpha)$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - 0,8^2} = 0,6$$

$$a = 10 \text{ м/с}^2 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 0,6 + 0,8\right) = 10 \text{ м/с}^2$$

Закон движения коробки (вдоль оси  $x$ ):

$$S = v_0 T - \frac{aT^2}{2}$$

$$\frac{a}{2} T^2 - v_0 T + S = 0$$

$$D = v_0^2 - 2aS$$

$$T = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 - 2aS}}{a}$$

$$T = \frac{4 \text{ м/с} + \sqrt{(4 \text{ м/с})^2 - 2 \cdot 10 \text{ м/с}^2 \cdot 1 \text{ м}}}{10}$$

Найдем, какой путь  $l$  пройдет коробка до остановки:

$$l = \frac{v_0^2}{2a}$$

$$l = \frac{(4 \text{ м/с})^2}{2 \cdot 10 \text{ м/с}^2} = 0,8 \text{ м}$$

После этого коробка начнет двигаться назад. Второй закон Ньютона в проекции на ось  $x$ :

$$F_{\text{тр}} - mg \sin \alpha = -ma_1$$

$$ma_1 = mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha$$

$$a_1 = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

$$a_1 = 10 \text{ м/с}^2 \cdot \left(0,8 - \frac{1}{3} \cdot 0,6\right) = 6 \text{ м/с}^2$$

Так как перед тем, как начать движение с такой ускорением, коробка останавливалась, её начальная скорость равна нулю. Следовательно,



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$S - l = \frac{a \cdot t_1^2}{2}, \quad t_1 - \text{время движения коробки}$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{2(S-l)}{a}}$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot (1 \text{ м} - 0,8 \text{ м})}{6 \text{ м/с}^2}} = \sqrt{\frac{4}{15}} \text{ с}$$

Кроме того, согласно закону движения для коробки до остановки,

$$l = V_0 t - \frac{a t^2}{2} \quad (t - \text{время движения коробки})$$

$$\frac{a}{2} t^2 - V_0 t + l = 0$$

$$D = V_0^2 - 2al$$

$$t = \frac{V_0 \pm \sqrt{V_0^2 - 2al}}{a}$$

$$t = \frac{4 \text{ м/с} \pm \sqrt{(4 \text{ м/с})^2 - 2 \cdot 6 \text{ м/с}^2 \cdot 0,8 \text{ м}}}{6 \text{ м/с}^2} = 0,4 \text{ с}$$

Таким образом,  $T = t + t_1$

$$T = 0,4 + \sqrt{\frac{4}{15}} \text{ с}$$

2) Все ранее записанные законы будут выполняться и в этом случае, поэтому  
мы ускорение коробки во время движения вверх по склону будем считать  $a$ . Значит,

$$L = \frac{V_0^2 - V^2}{2a}$$

$$L = \frac{(4 \text{ м/с})^2 - (2 \text{ м/с})^2}{2 \cdot 6 \text{ м/с}^2} = 0,6 \text{ м}$$

3) Рассчитаем от точки старта

По закону сохранения энергии

$$\frac{m V_0^2}{2} = m g H$$

$$H = \frac{V_0^2}{2g}$$

Расстояние от точки старта до точки остановки коробки равно  $x = \frac{V_0^2}{2a}$

$$H = x \sin \alpha = \frac{V_0^2 \sin \alpha}{2a}$$

$$H = \frac{(4 \text{ м/с})^2 \cdot 0,8}{2 \cdot 6 \text{ м/с}^2} = 0,64 \text{ м}$$

Ответ: 1)  $0,4 + \sqrt{\frac{4}{15}} \text{ с}$ ;

2)  $0,6 \text{ м}$ ;

3)  $0,64 \text{ м}$ .


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№3  
 Для реакции опоры  $N_1$  в 1-м случае,  $N_2$  в 2-м.  
 На санки действует сила  $F$ , сила тяжести  $m\vec{g}$ , сила реакции опоры  $N$  и сила трения ( $F_{тр1}$  в 1-м случае,  $F_{тр2}$  во 2-м).  
 Второй закон Ньютона в проекции на ось  $x$ :  
 $F \cos \alpha - F_{тр1} = m a_1$  ( $m$  - масса санок,  $a_1$  - их ускорение в первом случае)

Второй закон Ньютона в проекции на ось  $y$ :

$$N_1 + F \sin \alpha - m g = 0 \quad (\text{так как санки не движутся вверх})$$

$$N_1 = m g - F \sin \alpha$$

$$F_{тр1} = \mu N_1 = \mu (m g - F \sin \alpha)$$

Второй закон Ньютона в проекции на ось  $x$  (2 случай):

$$F - F_{тр2} = m a_2 \quad (a_2 - \text{ускорение санок во втором случае})$$

Второй закон Ньютона в проекции на ось  $y$  (2 случай):

$$N_2 - m g = 0$$

$$N_2 = m g$$

$$F_{тр2} = \mu N_2 = \mu m g$$

Так как конечная скорость санок и время разгона одинаковы в обоих случаях, то  $a_1 = a_2 = a$ . Тогда имеем:

$$\begin{cases} F \cos \alpha - \mu (m g - F \sin \alpha) = m a \\ F - \mu m g = m a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F \cos \alpha - \mu m g + \mu F \sin \alpha = m a \\ F = m(a + \mu g) \end{cases}$$

$$\begin{cases} m a \cos \alpha + \mu m g \cos \alpha - \mu m g + \mu m a \sin \alpha + \mu^2 m g \sin \alpha = m a \\ F = m(a + \mu g) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos \alpha (a + \mu g) + \mu \sin \alpha (a + \mu g) = a + \mu g \\ F = m(a + \mu g) \end{cases}$$

$$\cos \alpha + \mu \sin \alpha = 1$$

$$\mu = \frac{1}{\sin \alpha} - \cot \alpha = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

2) Если прекращается действие силы  $F$  или реакция опоры становится равной  $m g$ , так как ~~не существует~~ другие силы, <sup>действующие на санки</sup> кроме  $N$  и  $m g$ , то ~~не действуют на~~ имеют нулевые проекции на ось  $y$ .

Второй закон Ньютона в проекции на ось  $x$ :

$$-F_{тр} = -m a_T$$

$$F_{тр} = \mu N = \mu m g$$

$$\mu m g = m a_T$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$a_T = \mu g$$

Закон изменения скорости при движении санок после прекращения действия сил

$$F:$$
$$v = v_0 - a_T T$$

Поскольку конечная скорость санок равна нулю, то:

$$v_0 = a_T T$$

$$T = \frac{v_0}{a_T} = \frac{v_0}{\mu g} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g(1 - \cos \alpha)}$$

Ответ: 1)  $\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ ;  
2)  $\frac{v_0 \sin \alpha}{g(1 - \cos \alpha)}$ .



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**МФТИ**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№4

Количество теплоты, переданное газу в процессе 1-2 равно:

$$Q_{12} = C_{12} \nu (T_2 - T_1) = C_{12} \nu (4T_1 - T_1) = 3 C_{12} \nu T_1$$

$$Q_{12} = 3 \cdot 2,0 \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 1 \text{ моль} \cdot 400 \text{ К} = 19944 \text{ Дж}$$

Изменение внутренней энергии газа в процессе 1-2 равно:

$$\Delta U_{12} = \frac{3}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \frac{3}{2} \nu R (4T_1 - T_1) = \frac{9}{2} \nu R T_1$$

$$\Delta U_{12} = \frac{9}{2} \cdot 1 \text{ моль} \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 400 \text{ К} = 14958 \text{ Дж}$$

Согласно первому закону термодинамики,

$$Q_{12} = \Delta U_{12} + A_{12}$$

$$A_{12} = Q_{12} - \Delta U_{12}$$

$$A_{12} = 19944 \text{ Дж} - 14958 \text{ Дж} = 4986 \text{ Дж}$$

Определим вычисленные количество теплоты, изменение внутренней энергии и работу газа для остальных двух процессов:

Процесс 2-3:

~~Количество вычисленной теплоты:~~

$$Q_{23} = C_{23} \nu (T_3 - T_2) = C_{23} \nu (2^{1,5} T_1 - 4T_1) = (2\sqrt{2} - 4) C_{23} \nu T_1$$

$$Q_{23} = (2\sqrt{2} - 4) \cdot 0,5 \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 1 \text{ моль} \cdot 400 \text{ К} = (\sqrt{2} - 2) \cdot 3324 \text{ Дж}$$

$Q_{23} < 0$ , поэтому в этом процессе газ отдавал энергию.

$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2} \nu R (T_3 - T_2) = \frac{3}{2} \nu R (2^{1,5} T_1 - 4T_1) = 3(\sqrt{2} - 2) \nu R T_1$$

$$\Delta U_{23} = 3(\sqrt{2} - 2) \cdot 1 \text{ моль} \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 400 \text{ К} = (\sqrt{2} - 2) \cdot 9972 \text{ Дж}$$

Согласно первому закону термодинамики,

$$Q_{23} = \Delta U_{23} + A_{23}$$

$$A_{23} = Q_{23} - \Delta U_{23}$$

$$A_{23} = (\sqrt{2} - 2) \cdot 3324 \text{ Дж} - (\sqrt{2} - 2) \cdot 9972 \text{ Дж} = (2 - \sqrt{2}) \cdot 6648 \text{ Дж}$$

Процесс 3-1:

$$Q_{31} = C_{31} \nu (T_1 - T_3) = C_{31} \nu (T_1 - 2^{1,5} T_1) = (1 - 2\sqrt{2}) C_{31} \nu T_1$$

$$Q_{31} = (1 - 2\sqrt{2}) \cdot 2,5 \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 1 \text{ моль} \cdot 400 \text{ К} = (1 - 2\sqrt{2}) \cdot 8370 \text{ Дж}$$

$$\Delta U_{31} = \frac{3}{2} \nu R (T_1 - T_3) = \frac{3}{2} \nu R (T_1 - 2^{1,5} T_1) = \frac{3}{2} (1 - 2\sqrt{2}) \nu R T_1$$

$$\Delta U_{31} = \frac{3}{2} (1 - 2\sqrt{2}) \cdot 1 \text{ моль} \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 400 \text{ К} = (1 - 2\sqrt{2}) \cdot 4986 \text{ Дж}$$

Согласно первому закону термодинамики,

$$Q_{31} = \Delta U_{31} + A_{31}$$

$$A_{31} = Q_{31} - \Delta U_{31}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7


**МФТИ**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$A_{32} = (1-2\sqrt{2}) \cdot 8370 \text{ Дж} - (1-2\sqrt{2}) \cdot 4986 \text{ Дж} = (1-2\sqrt{2}) \cdot 3324 \text{ Дж}$$

X ПД цикла равен

$$\eta = 1 - \frac{(2\sqrt{2}-1) \cdot 8370 \text{ Дж} + (2-\sqrt{2}) \cdot 3324 \text{ Дж}}{19944 \text{ Дж}} = 2 - \frac{372}{3} - \frac{2-\sqrt{2}}{3} = \frac{73-8\sqrt{2}}{12}$$



Уравнение Менделеева-Клапейрона для газа в состоянии 1:

$$P_1 V_1 = \nu R T_1$$

А состояние 2:  $P_2 V_2 = \nu R T_2$

$$P_2 V_2 = 4 \nu R T_1$$

$$\frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} = 4$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{4}{\frac{V_2}{V_1}}$$

Ответ: 1) 4986 Дж

2)  $\frac{73-8\sqrt{2}}{12}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

- №5
- 1) На любой из шариков действуют силы электростатического отталкивания со стороны других трёх шариков, а также две опорные по модулю сил натяжения нити.



Второй закон Ньютона в проекции на ось  $x$  (параллельно диагонали квадрата, проходящей через точку  $A$ ):

$$F_1 \cos 45^\circ + F_2 \cos 45^\circ + F_3 - 2T \cos 45^\circ = 0 \quad (\text{так как ни один шарик не движется})$$

$$\sqrt{2}T = F_3 + \frac{\sqrt{2}}{2}(F_1 + F_2)$$

$$T = \frac{F_3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}(F_1 + F_2) = k \frac{q^2}{2\sqrt{2}b^2} + k \frac{q^2}{b^2} = k \frac{q^2}{b^2} \left( \frac{1}{2\sqrt{2}} + 1 \right)$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{mV_0^2}{2} = mgh$$

$$h = V_0 T - \frac{gT^2}{2}$$

~~$$V_0 = \sqrt{2gh}$$~~

~~$$V_0^2 = 2g(V_0 T - \frac{gT^2}{2})$$~~

~~$$V_0^2 - 2gTV_0 + \frac{g^2 T^2}{2} = 0 + g^2 T^2 = 0$$~~

$$5x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$D_T \geq 2 - 5 = -3$$

$$\frac{V_0 \cos \varphi \cdot 2T}{V_0 \sin \varphi \cdot T}$$

~~$$s_x = V_0 \cos \varphi \cdot 2T$$~~

$$y = V_0 \sin \varphi \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

$$t = V_0 \cos \varphi \cdot t$$

$$V_0 \sin \varphi \cdot t = \frac{gt^2}{2}$$

$$x = V_0 \cos \varphi \cdot t$$

$$\frac{V_0^2 \sin 2\varphi}{g}$$

$$t = \frac{2V_0 \sin \varphi}{g}$$

$$\frac{(20 \text{ м/с})^2}{2 \cdot 10 \text{ м/с}^2} = \frac{400}{20} = 20$$

~~$$C = \frac{Q}{\Delta} \left[ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}} \right]$$~~

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = CR_j$$

$$C = 2R$$

$$2R = \frac{Q}{\Delta T_1}$$

$$Q = 2R \Delta T_1$$

$$Q = 2 \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 2 \text{ моль} \cdot 400 \text{ К} = 6648$$

$$\begin{array}{r} \times 831 \\ 6648 \\ 3324 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 6648 \\ 3 \\ \hline 19944 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 3324 \\ 3 \\ \hline 9972 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 3324 \\ 4 \\ \hline 13296 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 831 \\ 6 \\ \hline 4986 \end{array}$$

$$8,31 \cdot \frac{831 - 10 + 831 \cdot 4}{831 \cdot 24} = \frac{5 + 2}{12}$$

$$\begin{array}{r} \times 831 \\ 18 \\ \hline 7358 \\ + 831 \\ \hline 744158 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 831 \\ 28 \\ \hline 6648 \\ + 831 \\ \hline 74958 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 9972 \\ 3324 \\ \hline 6648 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 831 \\ 6 \\ \hline 4986 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19944 \\ - 14958 \\ \hline 4986 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8310 \\ - 4986 \\ \hline 3324 \end{array}$$

$$\frac{5(2\sqrt{2}-1) + 2(2-\sqrt{2})}{12} = \frac{10\sqrt{2}-5+4-2\sqrt{2}}{12} = \frac{8\sqrt{2}-1}{12} = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$$

$$2 - \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$P_1 V_1 = \nu R T_1$$

$$P_1 V_1 = 1 \cdot 8,31 \cdot 400 = 3324$$

$$P_2 V_2 = \nu R T_2 = 4 \nu R T_1$$

$$P_2 V_2 = 13296$$

$$\frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} = 4$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{4V_1}{V_2}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

