МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 10

1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^{15}7^{11}$, bc делится на $2^{17}7^{18}$, ac делится на $2^{23}7^{39}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc.

2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь
$$\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2}.$$
При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m?

3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω, хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 17 : 7$. Найдите длину AB, если известно, что радиусы ω и Ω равны 7 и 13 соответственно.

4. [5 баллов] Решите уравнение
$$\sqrt{3x^2-6x+2}-\sqrt{3x^2+3x+1}=1-9x.$$

5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-13;26)$, $Q(3;26)$ и $R(16;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2-2x_1+y_2-y_1=14$.

6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a, для каждого из которых найдётся значение параметра b, при котором система
$$\begin{cases} ax+y-8b=0, \\ (x^2+y^2-1)\left(x^2+(y-12)^2-16\right) \leqslant 0 \end{cases}$$
имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B. Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC, если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответсвенно равны 5 и 2,5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ]

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

Задача №1

Замечу, что для того, чтобы abc было минимальным, abc ~~до~~ не должно делиться ни на какие простые числа, отличные от 2 и 7, иначе, т.к в условие дано только условие на ~~кратность~~ делимость на число вида $2^k \cdot 7^l$, то ~~раздела~~ разделив abc на данное простое, изначальное условие никак не нарушится, т.е, если, без ограничения общности, $a \vdots p$, где p - простое, $p \neq 2$, $p \neq 7$, то если $ab \vdots 2^{15} \cdot 7^{11}$, то $\frac{a}{p} \cdot b \vdots 2^{15} \cdot 7^{11} \Rightarrow$ следует искать ~~от~~ минимальное abc вида $2^n \cdot 7^m$. Т.е каждое из a, b, c имеет вид $2^i \cdot 7^j$

Пусть $a = 2^{\alpha_1} \cdot 7^{\beta_1}$; $b = 2^{\alpha_2} \cdot 7^{\beta_2}$; $c = 2^{\alpha_3} \cdot 7^{\beta_3}$, тогда,

$abc = 2^{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3} \cdot 7^{\beta_1+\beta_2+\beta_3}$.

Замечу, чтобы $ab \vdots 2^{15} \cdot 7^{11}$, нужно, чтобы $\alpha_1 + \alpha_2 \geq 15$ и $\beta_1 + \beta_2 \geq 11$

Аналогично расписываю для остальных двух условий

$bc \vdots 2^{17} \cdot 7^{18} \Rightarrow \alpha_2 + \alpha_3 \geq 17$ и $\beta_2 + \beta_3 \geq 18$

$ac \vdots 2^{23} \cdot 7^{39} \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_3 \geq 23$ и $\beta_1 + \beta_3 \geq 39$

Получаю две системы нер-в:

$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 \geq 15 \\ \alpha_2 + \alpha_3 \geq 17 \\ \alpha_1 + \alpha_3 \geq 23 \end{cases}$ и $\begin{cases} \beta_1 + \beta_2 \geq 11 \\ \beta_2 + \beta_3 \geq 18 \\ \beta_1 + \beta_3 \geq 39 \end{cases}$

Складывая нер-ва в 1ой системе, получаю, что $2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) \geq 55 \Rightarrow$
$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \geq 27.5$. но, т.к $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ - нат. числа (степени вхождения простого числа), то
$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \geq 28$.

Продолжение на след. листе.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ]

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

Продолжение Задачи №1.

Аналогично делаю со второй системой нер-в и после сложения получаю, что $2(\beta_1+\beta_2+\beta_3) \geq 68 \Rightarrow \beta_1+\beta_2+\beta_3 \geq 34$.

Т.к. ищется мин abc, где $abc = 2^{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3} \cdot 7^{\beta_1+\beta_2+\beta_3}$, то

нужно найти мин $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ и $\beta_1+\beta_2+\beta_3 \Rightarrow$ т.к.

$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 \geq 28$ и $\beta_1+\beta_2+\beta_3 \geq 34$, ~~то для мин abc~~, то

~~$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=28$, $\beta_1+\beta_2+\beta_3=34 \Rightarrow$ мин $abc = 2^{28} \cdot 7^{34}$~~

~~Ответ. $2^{28} \cdot 7^{34}$~~

~~Но пусть $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=28 \Rightarrow \alpha_1+\alpha_2=15$, $\alpha_1+\alpha_3=23$, $\alpha_2+\alpha_3=17$, если α_1 четно $\Rightarrow \alpha_2$ - нечет, α_3 - ч, но $\alpha_2+\alpha_3$ - нечет и, хотя $2+2=2$, если α_1 - нечет, а α_2 - чет, ситуац симметр~~

~~$\Rightarrow \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 \geq 29$~~

~~$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=28$, $\beta_1+\beta_2+\beta_3=34 \Rightarrow$ мин $abc = 2^{28} \cdot 7^{34}$~~

~~Пример $a=2^{11}$~~ Пусть $\beta_1+\beta_2+\beta_3=34 \Rightarrow$

если β_1, $\beta_1+\beta_2=11$, $\beta_2+\beta_3=12$, $\beta_1+\beta_3=34 \Rightarrow \underbrace{\beta_1+\beta_3}_{34}+2\beta_2=29$

$\Rightarrow \beta_2 < 0$ и $\Rightarrow$ нужно прибавить мин $12 \Rightarrow \beta_1+\beta_2+\beta_3 \geq 34+12 \geq 46 \Rightarrow$ β для мин $\beta_1+\beta_2+\beta_3=46 \Rightarrow$

$abc = 2^{28} \cdot 7^{46}$

Пример $a=2^4 \cdot 7^{16}$; $b=2^5 \cdot 7^7$

$c=2^{12} \cdot 7^{23}$

Ответ: $2^{28} \cdot 7^{46}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача №2.

$\cancel{\frac{a+b}{a^2+7ab+b^2}}$ $\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2} = \frac{a+b}{(a+b)^2-9ab}$.

Я ищу такое m, что числитель из знам были кратны m $\Rightarrow$ $a+b \vdots m$ и $(a+b)^2-9ab \vdots m$. рассмотрю ~~во~~ $(a+b)^2-9ab \vdots m$.

Из условия, что $a+b \vdots m \Rightarrow (a+b)^2 \vdots m \Rightarrow$ чтобы разность была кратна m $9ab \vdots m$. Пусть $m \vdots p$, p - простое, $p \neq 3$, тогда $9 \not\vdots p \Rightarrow$ ~~или~~ либо a, ~~или~~ либо $b \vdots p$. Без огр общности, пусть $a \vdots p \Rightarrow b \not\vdots p$, т.к иначе, если $a \vdots p$ и $b \vdots p$, то $\frac{a}{b}$ не будет не сокр (можно будете сократить на p). Но, тогда $a+b$ будет $\not\vdots p$, т.к $a \vdots p$ и $b \not\vdots p$, но $a+b \vdots m$, где $m \vdots p \Rightarrow a+b \vdots p$ — Противоречие, т.к число не может одновременно делиться и не делиться на $p \Rightarrow \nexists p$, что $p \neq 3$ и $m \vdots p \Rightarrow$ Единственное простое на которое может делиться m - это 3. Также, замечу, что если степень вхождения 3 в m хотя бы 3, т.е $m \geq 27$, то приходим к аналогичному противоречию, т.к степень вхождение 3 в 9 равна 2 $\Rightarrow ab \vdots 3 \Rightarrow$ либо $a \vdots 3$, либо $b \vdots 3 \Rightarrow$ Если $a \vdots 3$, то $b \not\vdots 3$, иначе $\frac{a}{b}$ - сократимая дробь (можно сократить на 3), но тогда $a+b \not\vdots 3$, т.к $a \vdots 3$ и $b \not\vdots 3$, но $a+b \vdots m$, где $m \vdots 3 \Rightarrow a+b \vdots 3$ — Противоречие $\Rightarrow$ степень вхождения 3 в m не больше 2. Приведу пример для $m=9$.

$a=1$, $b=8$ (важно, что дробь $\frac{a}{b} = \frac{1}{8}$ - несократима) $\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2} = \frac{1+8}{1-56+64} = \frac{9}{9}$, а эта дробь сократима на 9 $\Rightarrow$ существует такие a, b, что $m=9$. Максимальное $m=9$, есть пример. Ответ: 9.

Задача №3.

Дано: Ω - окр, ω - окр, O' - центр ω; O - центр Ω.
$O' \in \Omega$. радиус Ω - 13; радиус ω - 7.
AB - хорда Ω; AB кас ω в C, так что $AC : CB = 17 : 7$.
Найти: длину AB



Решение

Пусть $AC = 17x$, $CB = 7x$ ($AC : CB = 17 : 7$), т.к. AB - кас к ω, то $O'C \perp AB$ $\Rightarrow$ $\Delta O'CB$ - прям, где $O'C = 7$ ($O'C$ - рад ω); $CB = 7x$ $\Rightarrow$ по т. Пиф $O'B = \sqrt{CO'^2 + CB^2} = \sqrt{49 + 49x^2}$, а $O'B^2 = 49 + 49x^2$. Пусть $\angle CBO' = \alpha$, тогда $\cos\alpha = \frac{CB}{BO'}$.
Замечу, что $\angle AOO' = 2\angle ABO'$, т.к. $\angle AOO'$ - центральный и опир на AO', как и $\angle ABO'$. тогда $\angle AOO' = 2\alpha$. Замечу, что $\cos(2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$.

$\cos\alpha = \frac{CB}{BO'} \to \cos^2\alpha = \frac{CB^2}{BO'^2} = \frac{49x^2}{49 + 49x^2} = \frac{x^2}{x^2+1}$, $\cos(2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1 = 2 \cdot \frac{x^2}{x^2+1} - 1 =$
$= \frac{2x^2}{x^2+1} - \frac{1+x^2}{1+x^2} = \frac{2x^2 - x^2 - 1}{1+x^2} = \frac{x^2-1}{x^2+1}$. Т.к $\angle ACO' = 90° \Rightarrow \Delta ACO'$ - прям $\Rightarrow$ по т. Пиф

$AO'^2 = AC^2 + CO'^2 = 289x^2 + 49$. Из т. кос для $\Delta AOO'$ $\to$

$AO'^2 = AO^2 + OO'^2 - 2\cos(\angle AOO') \cdot AO \cdot OO'$, т.к $AO = OO' =$ рад $\Omega = 13$, то подставляя числ. знач получим:

$289x^2 + 49 = 13^2 + 13^2 - 2 \cdot 13^2 \cdot \cos(2\alpha)$

$289x^2 + 49 = 2 \cdot 13^2 - 2 \cdot 13^2 \cdot \frac{x^2-1}{x^2+1}$. Сделаю замену $t = x^2$ $(t \geq 0)$ $\to$

$289t + 49 = 2 \cdot 13^2 - 2 \cdot 13^2 \frac{t-1}{t+1}$ $(t \neq -1$, т.к $t \geq 0)$

$289t + 49 = 2 \cdot 13^2 \left(1 - \frac{t-1}{t+1}\right)$

$289t + 49 = 2 \cdot 13^2 \frac{t+1-t+1}{t+1} \to \cancel{28t}\ 289t + 49 = \frac{2 \cdot 13^2 \cdot 2}{t+1} \to 289t + 49 = \frac{4 \cdot 13^2}{t+1}$ домножу обе части на $t+1$ $\to$

$(289t + 49)(t + 1) = 676$

$289t^2 + 338t + 49 = 676$

$\cancel{289t^2+338t+49}$ Замечу, что это тоже что и $17^2t^2 + (17^2 + 7^2)t + 7^2 = 26^2$

Продолжение на следующем листе.

Продолжение Задачи №3

~~$17t^2 + 7 + (17^2 + 7^2)\dots$~~

$289t^2 + 338t + 49 = 676$, замету, что $t = 1$ подходит

~~$289t^2$~~ $289 + 338 + 49 = 676$

$289t^2 + 338t - 627 = 0$

$t^2 + \frac{338}{289}t - \frac{627}{289} = 0 \to$ т.к свободный член отрицательный, а один корней положительный (равен 1), то ~~из~~ т. Виета следует, что второй корень - отрицат $\Rightarrow$ он нам не подходит, т.к $t \geq 0 \Rightarrow$ единств корень этого ур-я $t = 1$. вернемся к изн. перем x:

$x^2 = t$, $x^2 = 1$, т.к. $17x$ - длина стороны $AC \Rightarrow x > 0 \Rightarrow$ из $x^2 = 1 \to x = 1$

т.к $AB = AC + CB = 17x + 7x = 24x$, и $x = 1 \Rightarrow AB = 24$

Ответ: 24.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача №4

$\sqrt{3x^2-6x+2}-\sqrt{3x^2+3x+1}=1-9x$

З-чу, что $x=\frac{1}{9}$ - корень, т.к правая часть равна 0, то

рассмотрим левую часть, т.к там ~~до~~ тоже должен быть 0, то

$3x^2-6x+2=3x^2+3x+1$

$9x=1 \to x=\frac{1}{9}$, т.е. левая часть тоже равна 0

Один из корней $=\frac{1}{9}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

Задача №5

~~З-ть~~ Зафиксирую точку с коорд $x_1; y_1$. Замечу, что она задает прямую, такую что все точки к коор x_2, y_2 удовл условию принадлежат ей, и все точки принадл ей удовл условию (условие на x_2 и y_2 ~~ф~~-линейно). Что это за прямая?

т.к. $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14 \to$

$2x_2 + y_2 = 14 + 2x_1 + y_1 \to$

$y_2 = -2x_2 + 14 + 2x_1 + y_1 \to$

$y_2 = -2(x_2 - 7 - x_1) + y_1 \to$ прямая. Также з-ту, что

~~б~~ боковые стороны парал. с вершинами $(-13;26);(0,0)$ и $(3;26);(16,0)$ лежат на прямых $y=-2x$ и $y=-2x+32$ соотв $\Rightarrow$ все такие прямые, которые задаются x_1, y_1 парал сторонам параллелограмма, также замечу, что также работает и в другую сторону



т.е. есть две прямые A и B, ~~что~~ которые парал сторонам, тогда каждую из т. $\in A$ могу взять как точку $(x_1; y_1)$ и для нее $\forall$ к условию будут подходить все т. $\in B$, причем между ними ровно 7 кл., т.к.



$2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 2x_1 + 14 - 2x_1 + y_1 - y_1 = 14$

$\to$ такие точка подходит.

Продолжение на след листе

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$ab : 2^{15} 7^{11}$

$bc : 2^{17} 7^{18}$

$ac : 2^{23} 7^{39}$

abc — $\alpha_1 \beta_1\ \alpha_2 \beta_2\ \alpha_3 \beta_3$

$\to abc = 2^{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3} \cdot 7^{\beta_1+\beta_2+\beta_3}$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ - ст. в 2
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ - ст. в 7

$\alpha_1 + \alpha_2 \geq 15$

$\beta_1 + \beta_2 \geq 11$

$\alpha_2 + \alpha_3 \geq 17$

$\beta_2 +$

$\alpha_1 + \alpha_2 \geq 15$

$\alpha_2 + \alpha_3 \geq 17$

$\alpha_1 + \alpha_3 \geq 23$

$\to \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 \geq \frac{15+17+23}{2} = \frac{55}{2} \Rightarrow$

$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 \geq 28$

$\min \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 = 28$

~~$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$~~

$\beta_1 + \beta_2 \geq 11$

$\beta_2 + \beta_3 \geq 18$

$\beta_1 + \beta_3 \geq 39$

$\to \beta_1+\beta_2+\beta_3 \geq \frac{11+18+39}{2} = \frac{68}{2} = 34$

$abc = 2^{28} \cdot 7^{34}$

$\frac{a}{b} : (a,b) = 1.$

$\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2}$ max $m \to a+b \vdots m;\ a^2-7ab+b^2 \vdots m$

$\frac{a+b}{a^2-7ab+b^2} = \frac{a+b}{(a-b)^2-5ab}$

③ $a \vdots 3$ $b \vdots 3$ $\cancel{5}$

$(a-b)^2 \geq 1$

$(a+b)^2 - 9ab =$

$\frac{1}{2}$

$= (a+b-3\sqrt{ab})(a+b+3\sqrt{ab}) = (a+b)\cancel{(\sqrt{a}+\sqrt{b})}^2$

$\cancel{\frac{1+2}{1+16}}$

$= ((\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 - \sqrt{ab})((\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 + \sqrt{ab})$

$m \vdots p \Rightarrow 9 \vdots p \Rightarrow$

$a \vdots p \to b \vdots p \Rightarrow$

$a+b \vdots p$, но $a+b \vdots m$

$m=9$

$\frac{a+b}{(a+b)^2-9ab}$

$\frac{1}{8}$ $\frac{1+8}{9^2-9 \cdot 8} / 9$

$a+b \vdots m \Rightarrow \underset{\vdots m}{(a+b)^2} - 9ab \vdots m \Rightarrow 9ab \vdots m$

$m \leq a+b$

$m \leq 9ab$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$17^2 t^2 + (17^2+7^2)t - (26^2-7^2)$

$D = (17^2+7^2)^2 + 4\cdot 17^2(26^2-7^2)$

$676 - 49 = 627$



$AO \to x$

$OB \to x$

$17 \cdot 17 = 289$

$13 \cdot 13 = 169$

$26 \cdot 13 = 338$

$169 \cdot 2 = 338$

$26 \cdot 26 = 676$

$627 : 19 = 33$

$\cos^2\alpha = \dfrac{289x^2}{289x^2+49}$





$AO' = \sqrt{17^2x^2+49} = \sqrt{289x^2+49}$

$289 + 338 + 49 = 676$

$\cos 2\alpha = \cos(\alpha+\alpha) = \cos\alpha\cdot\cos\alpha - \sin\alpha\cdot\sin\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \cos^2\alpha - 1 + \cos^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

$BO'^2 = OB^2 + OO'^2 - 2\cos(2\alpha)\,OB\cdot OO' =$

$= 2\cdot 13^2 - 2\cdot 13^2\cdot(2\cos^2\alpha - 1)$



$AO'^2 = 289x^2+49 \qquad \cos^2\alpha = \left(\dfrac{17x}{\sqrt{289x^2+49}}\right)^2 = \dfrac{289x^2}{}$

$BO' = \sqrt{49+49x^2} \qquad \cos^2\beta = \dfrac{49x^2}{49+49x^2} = \dfrac{x^2}{1+x^2}$

$\cos(2\beta) = 2\cos^2\beta - 1 = \dfrac{2x^2}{1+x^2} - \dfrac{1+x^2}{1+x^2} = \dfrac{2x^2-1-x^2}{1+x^2} = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

$289x^2+49 = 13^2+13^2 - 2\cos 2\beta\, 13^2 =$

$= 2\cdot 13^2 - 2\cdot 13^2\cdot\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)$

$2\cdot 338 = 676$

$289t+49 = 2\cdot 13^2 - 2\cdot 13^2\,\dfrac{t-1}{t+1}$

$289t+49 = 338 - 338\,\dfrac{t-1}{t+1}$

$289t+49 = 338\left(1-\dfrac{t-1}{t+1}\right)$

$289t+49 = 338\,\dfrac{t+1-t+1}{t+1}$

$289t+49 = 338\,\dfrac{2}{t+1}$

$(289t+49)(t+1) = 289t^2 + 338t + 49 = 676$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$\sqrt{3x^2-6x+2}-\sqrt{3x^2+3x+1}=1-9x$ $\quad 3x^2-6x+2\geq 0$; $3x^2+3x+1\geq 0$

$3x^2-6x+2=0$ $\quad \cancel{3x^2-6x-2=0}$ $\quad 3x^2+3x+1=0$

$D_1=9-6=3$ $\quad D=9-3=6$

$x_1=\frac{3+\sqrt{3}}{3}$ $\quad x_2=\frac{3-\sqrt{3}}{3}$ $\quad x_1=\frac{-3-\sqrt{3}}{3}$; $x_2=\frac{-3+\sqrt{3}}{3}$

$D=36-4\cdot 2\cdot 3$

$3x^2+3x+1=\left(x+\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right)\left(x-\frac{-3+\sqrt{3}}{3}\right)$

$\sqrt{D}=2\cdot\sqrt{9-6}=2\sqrt{3}$

$3x^2-6x+2=\left(x-\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right)\left(x-\frac{3-\sqrt{3}}{3}\right)$

$\cancel{x_1=\frac{6-2\sqrt{3}}{2\cdot 3}=\frac{3-\sqrt{3}}{}}$

$\left(x+\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right)\left(x-\frac{-3+\sqrt{3}}{3}\right)=x^2+\frac{3+\sqrt{3}}{3}+3x\ \cancel{\sqrt{x}}$

$\sqrt{}$

$3x^2-6x+2=\left(x-\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right)\left(x-\frac{3-\sqrt{3}}{3}\right)$ $\quad x_{1,2}$: $D=9-12<0\rightarrow$ нет корней

$\sqrt{3x^2-6x+2}-\sqrt{3x^2+3x+1}$ $\quad (-75x^2+15x+2)(-75x^2+15x+2)=$

$=\cancel{75x^4}\ 75^2x^4-75\cdot 15x^3-150x^2-150x^3$

$3x^2 \quad \cancel{3x^2}$

$x^2-2x+1+x^2-2x+1+x^2-2x+1-1=3(x-1)^2-1$

$x^2+2x+1+x^2+2x+1+x^2+2x+1-3x-2=3(x+1)^2-3x-2$

$\sqrt{3x^2-6x+2}-\sqrt{3x^2+3x+1}=1-9x\ |\wedge 2$

$\left(\underset{a}{\sqrt{3x^2-6x+2}}-\underset{b}{\sqrt{3x^2+3x+1}}\right)^2=\cancel{3x^2-6x+2}$ $\quad (a-b)^2=a^2+b^2-2ab$

$(3x^2-6x+2+3x^2+9x+1)-2\sqrt{(3x^2-6x+2)(3x^2+3x+1)}=1+81x^2-18x$

$6x^2-3x+3-2\sqrt{9x^4+9x^3+3x^2-18x^3-18x^2-6x+6x^2+6x+2}=1+81x^2-18x$

$-75x^2+15x+2=2\sqrt{\cancel{9x^4-9x^3-15x^2+6x^2}}$

$\sqrt{9x^4-9x^3-9x^2+2}$

$(-75x^2+15x+2)^2=4(9x^4-9x^3-9x^2+2)$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$\sqrt{3x^2-6x+2}-\sqrt{3x^2+3x+1}=1-9x$

$1-9x=0 \Rightarrow 1=9x \Rightarrow x=\frac{1}{9}$

$3x^2-6x+2=3x^2+3x+1$

$x=\frac{1}{9}$ - корень

$-9x=-1$

$x=\frac{1}{9}$

$3x^2-6x+2 \mid x-\frac{1}{9}$, $3x-\frac{17}{3}$

$3x^2-6x+2$

$3x^2$

$3x^2-6x+2=(9x-1)(3x-\frac{1}{3})+1\frac{2}{3}$

$27x^2-54x+18 \mid 9x-1$, $3x-\frac{17}{3}$

$27x^2-6x+2 \mid 9x-1$, $3x-\frac{1}{3}$, $1\frac{2}{3}$

$3x^2-6x+2=9(x-\frac{1}{9})$

$3x^2+3x+1 \mid x-\frac{1}{9}$, $3x+\frac{10}{3}$

$\sqrt{a}=1-9x$

$a=$

$3x^2-6x+2=(x-\frac{1}{9})(3x-\frac{17}{3})+\frac{37}{27}$

$3x^2+3x+1=(3x+\frac{10}{3})(x-\frac{1}{9})+\frac{37}{27}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

[ ] [ ] [ ] [ ] [X] [ ] [ ]

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

Продолжение задачи №5.

Тогда, ~~в~~ ~~их~~ не забывая условие, что все точки имеют целочисл коорд и внутри изн паралл, то в качестве прямой на которой ~~буду~~ отмечать точку с коорд $x_1;y_1$ можно выбрать

-13,26   -4,26   0,26   3,26

любую прямую, проходящую через точка с коорд $\{(-13;26), \dots, (-4,26)\}$ и паралл боковым сторонам паралл

Если выберу проходящую через точку $x;26$, где $x > -4$, то ей паралл через 7 клеток будет проходить через $(x+7>3\,;26)$, что уже не в парал.

Таких точек ровно 10. Заметим, что на каждой такой прямой ровно 14 ~~целых~~ точек с целочисл координатами

Тогда ~~для~~ каждой из этих 10 прямых ~~на ней есть~~ на которых я выбираю точку x_1, y_1 ставится ровно одна прямая на которой я выбираю точку с коорд x_2, y_2 тогда всего вариантов выбрать пару — $10 \cdot 14 \cdot 14 = 1960$

кол-во пар прямых

кол-во вариантов для точки (x_1, y_1) на этой прямой

кол-во вариантов для точки (x_2, y_2) на прямой, которая ставится в соответствие

Ответ: 1960.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



14
16
14
56
1
4
196

$\cancel{X}$ $-13 \le x \le 16$

$0 \le y \le 26$

$x_1 \quad y_1$

$0 \quad 1$

$x_1 \quad y_1 \qquad x_2 \quad y_2$

$16 \quad 0$

$(2x_2+y_2)^2 = 14^2 + (2x_1+y_1)^2 + 2 \cdot 14(2x_1+y_1)$

$PO =$

$y = kx+b$

$y = kx$

$2 = \cancel{x_1} -k \to k=-2$

$y=-2x$

$x_1; y_1 \to \cancel{x_1 \to 2y_1 > |x_1|}$

$\cancel{2y_1}$

$y_1 > -2x_1$

$2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 14.$

$x_2 \in \{0, \dots, 26\} \to y_2 - y_1 \to zer$

y ~~max~~ мин $y_2 - y_1 = 0$

~~$228 + \{0,$~~

$x_2 \in \{-13; 16\}$

$2x_2 + y_2 = 14 + 2x_1 + y_1$

$2x_2 + y_2 \geq 14.$

	x_1	y_1	x_2	y_2
	0	0	7	0
	−1	2	~~0~~	
				2
	7	0	6	2
	14		5	4
			4	6
			−6	26

13

~~$y = 2x+16$~~

$y = -2(x-16) \Rightarrow$

$y = -2x + 32.$

$y_1 < -2x_1 + 32$

$-2(x-7-x_1) + y_1$

$y_2 = -2x_2 + 14 + 2x_1 + y_1$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$(-75x^2+15x+2)^2 = 4(9x^4-9x^3-9x^2+2)$

$(-75x^2+15x+2)(-75x^2+15x+2) = 5^2 15^2 x^4 - 5\cdot 15^2 x^3 - 15\cdot \cancel{9} x^2 - 5\cdot 15^2 x^3 +$

$2\cdot 5\cdot 15 x^2$

$+15^2x^2 + 15\cdot 2x - 2\cdot 15\cdot 5x^2 + 2\cdot 15 x + 4.$

$= 5^2\cdot 15^2 x^4 - 2\cdot 5\cdot 15^2 x^3 - 4\cdot 5\cdot 15x^2 + 15^2x^2 + 4\cdot 15x + 4 = 4\cdot 9x^4 - 4\cdot 9x^3 - 49x^2 + 8$

$(5^2\cdot 15^2 - 4\cdot 9)x^4$

$x - \frac{1}{3}$

$x^3\cdot(5^2+15^2-4\cdot 9)$

$(1-9x)^2 = 1 + 81x^2 - 18x$

$\sqrt{3x^2} + \sqrt{3x^2-6x+2} - \sqrt{3x^2+3x+1}$

$x^2-2x+1 = t$

$3t = 3x^2-6x+3 = 3x^2+3x+1+2 + 9x$

~~$\sqrt{3(t+1)}$ $3t-1$~~

$3x^2+3x+1 = 3t + 9x - 2$

$\sqrt{3t-1} - \sqrt{}$

$1-9x = (1-3\sqrt{x})(1+3\sqrt{x})$

$\sqrt{3x^2-6x+2} - \sqrt{3x^2+3x+1} = 1-9x$

~~$\sqrt{3x^2-6x+2+9x+1} = \sqrt{3x^2+3x+1} + 1$~~

$\sqrt{3x(x-2)+2} - \sqrt{3x(x+1)+1}$

$\sqrt{3x\left((x-2)+\frac{2}{3x}\right)} - \sqrt{3x\left((x+1)+\frac{1}{3x}\right)} = 1-9x$

~~$9x^2\sqrt{} - 9x^2\sqrt{} = 1-9x$~~