



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 4



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^6 3^{13} 5^{11}$, bc делится на $2^{14} 3^{21} 5^{13}$, ac делится на $2^{16} 3^{25} 5^{28}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой AC в точке A , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке E , а катет BC – в точке F . Известно, что $AB \parallel EF$, $AB : BD = 1,4$. Найдите отношение площади треугольника ACD к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $10 \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$.

4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} 5x + 6ay - b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_x 11 = \log_{x^3} \frac{1}{121} - 5, \quad \text{и} \quad \log_{11}^4(0,5y) + \log_{0,5y} 11 = \log_{0,125y^3} (11^{-13}) - 5.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-15;90)$, $Q(2;90)$ и $R(17;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $6x_2 - 6x_1 + y_2 - y_1 = 48$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 180, $SA = BC = 20$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 6$, а радиус сферы Ω равен 8.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Для минимизации значений a, b, c положим, что в их разложении на простые множители отсутствуют ~~и~~ простые числа, отличные от 2, 3, 5.

$$\text{Пусть } a = 2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 5^{\alpha_3}; \quad b = 2^{\beta_1} \cdot 3^{\beta_2} \cdot 5^{\beta_3}; \quad c = 2^{\gamma_1} \cdot 3^{\gamma_2} \cdot 5^{\gamma_3}.$$

Условие задачи эквивалентно системе систем:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 \geq 6 \\ \beta_1 + \gamma_1 \geq 14 \\ \gamma_1 + \alpha_1 \geq 16 \end{cases}, \quad \begin{cases} \alpha_2 + \beta_2 \geq 13 \\ \beta_2 + \gamma_2 \geq 21 \\ \gamma_2 + \alpha_2 \geq 25 \end{cases}, \quad \begin{cases} \alpha_3 + \beta_3 \geq 11 \\ \beta_3 + \gamma_3 \geq 13 \\ \gamma_3 + \alpha_3 \geq 28 \end{cases}.$$

При $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

У первой системы существует решение, при котором ^{все} неравенства обращаются в равенства: $\alpha_1 = 4, \beta_1 = 2, \gamma_1 = 12$.

У второй системы следует, что $\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 \geq 29,5$; учитывая, что они целые неотрицательные, получаем $\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 \geq 30$. Существует решение $\alpha_2 = 9, \beta_2 = 5, \gamma_2 = 17$; но тогда сумма равна 31. Если любое из чисел $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ уменьшить на 1, также получим решение; в таких решениях сумма равна 30. Чем больше каждое из чисел $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$, тем больше искомое произведение $abc = 2^{\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1} \cdot 3^{\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2} \cdot 5^{\alpha_3 + \beta_3 + \gamma_3}$, так что возьмем эти значения. То есть, мы докажем, что $\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 \geq 30$, и приведем пример, когда неравенство обращается в равенство.

У третьей системы $\gamma_3 + \alpha_3 \geq 28$; учитывая, что $\beta_3 \geq 0$, получаем $\alpha_3 + \beta_3 + \gamma_3 \geq 28$. Пример: $\alpha_3 = 14, \beta_3 = 0, \gamma_3 = 14$, все неравенства выполняются.

$$\text{Итак, } (\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1)_{\min} = 18, \quad (\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2)_{\min} = 30, \quad (\alpha_3 + \beta_3 + \gamma_3)_{\min} = 28,$$

$$(abc)_{\min} = 2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{28}.$$

$$\text{Ответ: } 2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{28}.$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Продолжение задачи №2!

Заметим, что, если при измерении AO на величину x_1 , NO измерилась на величину x_2 , то при повторном измерении AO на величину x_1 , NO также измерилась на величину x_2 , то есть, NO и AO линейно зависят.

Найдём такое NO , что $NO = AO$. Обозначим $NO = x$.

Линейность: $\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{5}} - x = \frac{2}{\sqrt{5}} - x$ Равая, получаем:

$$\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{5}} - \frac{3}{\sqrt{70}} = \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{9}{205}$$
$$x = \frac{6\sqrt{5} - 3\sqrt{14}}{1}$$

$$OH = AO - \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{30 - 3\sqrt{70}}{10} - \frac{34}{10\sqrt{5}} = \frac{28}{5}\sqrt{5} - 3\sqrt{14};$$

$$CF = 2NG = 2OH = \frac{56}{5}\sqrt{5} - 3\sqrt{14};$$

$$\triangle CEF \sim \triangle ADC; \frac{S_{ADC}}{S_{CEF}} = \left(\frac{CF}{AC}\right)^2 = \left(\frac{\frac{56}{5}\sqrt{5} - 3\sqrt{14}}{\sqrt{2}}\right)^2 =$$

$$= \left(\frac{56}{5\sqrt{10}} - 3\sqrt{7}\right)^2 = \frac{56^2}{10} - \frac{6 \cdot 56 \cdot \sqrt{7}}{\sqrt{10}} + 9 \cdot 7 = \left(\frac{56 - 3\sqrt{70}}{\sqrt{10}}\right)^2 =$$

$$= \frac{7}{10} (64 \cdot 7 - 2 \cdot 8\sqrt{4} \cdot 3\sqrt{10} + 9 \cdot 10) = \frac{7}{10} (448 - 48\sqrt{10} + 90) = 376,6 - 33,6\sqrt{10}.$$

Ответ: $376,6 - 33,6\sqrt{10}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




$AB:BD = 14 \Leftrightarrow AD:BD = 2:5 \Leftrightarrow AD:CD:BD = 2:\sqrt{10}:5$
 (т.к. CD — высота, опущенная из прямого угла); отсюда $AC:BC =$
 $= \sqrt{14}:\sqrt{35} = \sqrt{2}:\sqrt{5}$. Положим $AC = \sqrt{2}a$; $BC = \sqrt{5}a$; тогда
 $CD = \frac{\sqrt{10}}{5}a$, $AD = \frac{2}{5}a$ тогда $AB = \sqrt{2}a$. При увеличении сторон в a раз
 площади увеличатся в a^2 раз, но отношение площадей не изменится.

EF — хорда окружности, значит, если N — середина EF , то
 центр окружности лежит на прямой, $\perp AB$ и прох. чз N (т.к.
 $EF \parallel AB$). Центр окружности также лж. на прямой, $\perp AC$ и прох. чз A .

Построим следующие чертеж:
 Задача состоит в нахождении такой
 пары точек E, F (по которым строятся
 точки N и O), что $NO = AO = R$.

Обозначим $CF = f$. NG — средняя
 линия в $\triangle CDE$, поэтому $NG = \frac{f}{2}$.
 $NO \perp AB \perp CD$, поэтому $NO \parallel CD$,
 $NOHG$ — параллелограмм, $OH = \frac{f}{2}$.
 Отсюда $OA = \frac{f}{2} + \frac{2}{\sqrt{5}}$.



Возьмем NO . Если в качестве пары точек (E, F) взять
 пару (C, C) , то $f=0$, $NO = CH = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\frac{2}{\sqrt{5}})^2} = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{5}}$.

Если в качестве пары (E, F) взять (D, B) , то $NO = MW$, где
 M — середина BD — $\triangle BMC \sim \triangle AMJ$, $MC:MJ = MB:MA =$

$$= \frac{\frac{1}{2}BD}{\frac{1}{2}BD + AD} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{\sqrt{5}}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{5}{9}, \quad CJ:MJ = \frac{14}{9}$$

$$\triangle MJW \sim \triangle CJH, \quad MW:CH = MJ:CJ = \frac{9}{14}$$

$MW = \frac{9}{14}CH = \frac{9}{\sqrt{70}}$. При этом, если MK — средняя линия

в $\triangle BCD$, то $MK = \frac{BC}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} = WH$; $WA = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{9}{2\sqrt{5}}$.

Итак, у нас есть две пары значений NO и AO :

$$\left\{ NO = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{5}}, AO = \frac{2}{\sqrt{5}} \right\}; \left\{ NO = \frac{9}{\sqrt{70}}, AO = \frac{9}{2\sqrt{5}} \right\}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Вспомним тождество $\arcsin(a) + \arccos(a) = \frac{\pi}{2}$; перепишем исходное уравнение:

$$10 \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin(\sin(x)) \right) = 9\pi - 2x$$

$$-10 \arcsin(\sin(x)) = 4\pi - 2x$$

$$\arcsin(\sin(x)) = \frac{1}{5}x - \frac{2\pi}{5}$$

Найдем, в какой области следует искать решение.


$$-\frac{\pi}{2} \leq \arcsin(a) \leq \frac{\pi}{2}, \text{ откуда } -\frac{\pi}{2} \leq \frac{1}{5}x - \frac{2\pi}{5} \leq \frac{\pi}{2};$$

$$-\frac{5\pi}{2} \leq x - 2\pi \leq \frac{5\pi}{2}; \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{9\pi}{2}.$$

Пользуясь следующими правилами:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \implies \arcsin(\sin(x)) = x \\ \sin(x) = \sin(x_1) \implies \arcsin(\sin(x_1)) = \arcsin(\sin(x)) \end{cases}$$

построим график функции $y = \arcsin(\sin(x))$, а также график функции $y = \frac{1}{5}(x - 2\pi)$, в пределах $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{9\pi}{2}$.



Отметить их пересечение,
это и есть решение
исходной системы.

Тривиальные решения: $x \in \left\{ -\frac{\pi}{2}; 2\pi; \frac{9\pi}{2} \right\}$.

Первое нетривиальное решение — пересечение прямой $y = \frac{1}{5}(x - 2\pi)$ и прямой $y = \pi - x$; $x = \frac{7\pi}{6}$. Второе нетривиальное решение симметрично первому оси $x = 2\pi$, т.е. $x = 4\pi - \frac{7\pi}{6} = \frac{17\pi}{6}$.

Ответ: $x \in \left\{ -\frac{\pi}{2}; \frac{7\pi}{6}; 2\pi; \frac{17\pi}{6}; \frac{9\pi}{2} \right\}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Осталось найти такую прямую $x = m(y + \frac{45}{7})$, что она имеет с окружностью $y^2 + x^2 = 25$ одну общую точку.

$$y^2 + m^2(y^2 + \frac{90}{7}y + \frac{2025}{49}) = 25;$$

$$(m^2 + 1)y^2 + (\frac{90}{7}m^2)y + (\frac{2025}{49}m^2 - 25) = 0$$

Условие на единственное решение: $D = 0$. (D — дискриминант).

$$(2 \cdot \frac{45}{7} m^2)^2 - 4(m^2 + 1)(\frac{45}{7} m^2 - 25) = 0$$

$$4 \cdot \frac{45^2}{7} m^4 - 4(\frac{45^2}{7} m^2 + \frac{45^2}{7} m^2 - 25m^2 - 25) = 0;$$

$$-4(\frac{45^2}{7} - 25)m^2 - 25 = 0;$$

$$(\frac{45}{7} - 5)(\frac{45}{7} + 5)m^2 = 25;$$

$$10 \cdot 80 \cdot m^2 = 25 \cdot 7^2;$$

$$m = \pm \frac{35}{\sqrt{800}} = \pm \frac{35\sqrt{2}}{40}; m > 0; m = \frac{35\sqrt{2}}{40}.$$

Подставим $k = -\frac{6a}{5}$ в неравенство $-m < k < m$:

$$-\frac{35\sqrt{2}}{40} < -\frac{6a}{5} < \frac{35\sqrt{2}}{40}; \quad -\frac{35\sqrt{2}}{40} < \frac{6a}{5} < \frac{35\sqrt{2}}{40};$$

$$-\frac{35\sqrt{2}}{48} < a < \frac{35\sqrt{2}}{48}.$$

Ответ: $a \in (-\frac{35\sqrt{2}}{48}; \frac{35\sqrt{2}}{48})$.

Для задач 4 и 210 2 есть у 2!

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Второе уравнение можно эквивалентно:

$$\begin{cases} y^2 + x^2 = 5^2 & \text{— окружность} \\ (y+9)^2 + x^2 = 2^2 & \text{— окружность} \end{cases}$$

Его решение изображено на
графике справа.




Первое уравнение можно переписать в виде $x = -\frac{6a}{5}y + \frac{b}{5}$.

На графике это прямая. Поскольку значение b не задано, y -часть равенства свободного члена $\frac{b}{5}$ положение прямой может быть любым, но ее угловой коэффициент равен $k = -\frac{6a}{5}$.

Пусть угловые коэффициенты двух внутренних касательных к окружностям равны m и $-m$ ($m > 0$). Это верно, т.к. центры обеих окружностей лежат на прямой $x=0$. Очевидно, что при $-m < k < m$ существует такое положение прямой из условия, что она пересекает каждую окружность в двух различных точках. При $k = \pm m$ максимальное число взаимных пересечений равно 2. Запишем поиск m .

Общие внутренние касательные пересекаются в центре гомологии, переводящей одну окружность в другую, с отрицательным коэффициентом гомологии.



Крайняя верхняя точка одной окружности, очевидно, перейдет при такой гомологии в крайнюю нижнюю точку другой окружности, значит, соединяющая их прямая проходит через центр гомологии. При этом центр гомологии лежит на прямой, проходящей через центры окружностей.

Пусть координата центра гомологии $(c, 0)$. Тогда

$$\frac{2-0}{-9-c} = \frac{2-(-5)}{-9-0}; \text{ отсюда } -18 = 7(9+c), c = -\frac{45}{7}.$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Обозначим $a = \log_{11}(x)$; $b = \log_{11}(y)$ $\log_{11}(0,5y)$.
ОДЗ: $x > 0$; $y > 0$; $x \neq 1$; $y \neq 2$.
При этом $xy = 2 \cdot 11^{a+b}$.

Условие на x эквивалентно условию на a : $3a^5 + 15a - 16 = 0$.
Заметим, что без учета ОДЗ у такого уравнения относительно a
имеется ровно одно действительное решение, поскольку
функция $F(a) = 3a^5 + 15a - 16$ — неубывающая как сумма
неубывающих.

Аналогично: условие на y эквивалентно условию на b :
 $3b^5 + 15b - 16 = 0$; без учета ОДЗ существует ровно одно действи-
тельное решение отн. b .

~~Следствие из этих двух условий: $3a^5 + 15a + 3b^5 + 15b = 0$,
 $3(a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4 + 5) = 0$,~~

~~При этом $a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4 = (a-b)^4 + 3a^3b - 5a^2b^2 + 3ab^3 =$
 $= (a-b)^4 + 3$~~

~~Обратим из условия на a , что $a \geq 0$, и из условия на b , что
 $b \leq 0$, т.е. $a \neq 0$ и $b \neq 0$, поэтому~~

Заметим, что если некоторое a подходит под условие, то
 $b = -a$ также подходит под условие, и наоборот. Это
означает, что, если оба числа a, b подходят под свои условия,
то $a+b = 0$.

ОДЗ в терминах a и b : $a \neq 0$; $b \neq 0$. Обратим, $a = 0$
не подходит под условие и не является решением, так что условие
 $a \neq 0$ выполнено. Аналогично, выполнено условие $b \neq 0$.

$xy = 2 \cdot 11^{a+b} = 2$. $xy \neq 0$, так что $\begin{cases} x \neq 0 \\ y \neq 0 \end{cases}$ выполнено

Ответ: $(xy) \in \{2\}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Пусть прямая с угловым коэффициентом -6 , проходящая через A , имеет уравнение $y = -6x_1 + C$. Тогда по условию заданная прямая с угловым коэффициентом -6 , проходящая через B , имеет уравнение $y_2 = -6x_2 + C + 48$. За C берется некоторая константа. ~~Проверим это условие.~~

Если A лежит на прямой $y = -6(x - c)$,
то B лежит на прямой $y = -6(x - (c+8))$. Здесь c — некоторая константа.

Вот удача, -6 — ~~какой~~ угловой коэффициент одной пары боковых сторон параллелограмма! Дальше несложно.

~~Любая две прямые~~ Это значит, что прямые, упомянутые ранее, либо не имеют общих точек с параллелограммом, либо имеют $15+1 = 16$ общих точек, координаты которых — целые числа. Такие прямые имеют C от 0 до 17 включительно. Не забываем, что $C+8$ тоже от 0 до 17 включительно. Итого есть 10 вариантов значений c — от 0 до 9 включительно, и 10 вариантов пар прямых, на которых соответственно лежат A и B .

На каждой прямой есть 16 точек с целыми координатами. Выбрать пару (A, B) на паре прямых можно $16 \cdot 16 = 256$ способами, выбрать пару прямых — 10 способов, итого $256 \cdot 10 = 2560$.

Ответ: 2560.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{aligned}\angle Ok_1k &= \arctg\left(\frac{40}{48}\right) = \arctg\left(\frac{5}{6}\right); \\ \angle Ok_1N &= \arctg\left(\frac{5}{6}\right); \\ \angle k_1k_1N &= 2 \arctg\left(\frac{5}{6}\right) = \arctg\left(\frac{2 \cdot \frac{5}{6}}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2}\right) = \\ &= \arctg\left(\frac{60}{11}\right) - \text{искомое.}\end{aligned}$$



Ответ: 1) 8100
2) $\arctg\left(\frac{60}{11}\right)$.

Для задач 7 это 2 метра 2!

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$SP = MQ$, $SQ = MP$, $SP \cdot SQ = MP \cdot MQ$; у точек S и M равные стелит отн. сферы \mathcal{D} . SL кас. \mathcal{D} , MK кас. \mathcal{D} , откуда $SL = MK$. Также $AL = AK$ как сферы касательных из одной точки, поэтому $AS = AM$. $AM = \frac{2}{3} AA_1$, $AA_1 = \frac{3}{2} AM = 30$.

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot (AA_1 \cdot \sin(\angle AA_1B)) = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 30 \cdot \sin(\angle AA_1B) = 300 \sin(\angle AA_1B) = 180; \sin(\angle AA_1B) = \frac{3}{5}$$

5.0.0. $AB \perp AC$, тогда $\cos(\angle AA_1B) = \frac{4}{5}$; $\cos(\angle AA_1C) = -\frac{4}{5}$.

По теореме косинусов;

$$CM = 10 \cdot \sqrt{2 - 2 \cdot (-\frac{4}{5})} = 10 \cdot \sqrt{2 + \frac{8}{5}} = 10 \cdot \sqrt{\frac{18}{5}} = \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = 6\sqrt{10}$$

$$CC_1 = \frac{3}{2} CM = 9\sqrt{10}$$

Аналогично, $BM = 10 \cdot \sqrt{2 - 2 \cdot \frac{4}{5}} = 10 \sqrt{\frac{2}{5}} = 2\sqrt{10}$, $BB_1 = 3\sqrt{10}$.

$$AA_1 \cdot BB_1 \cdot CC_1 = 30 \cdot 9\sqrt{10} \cdot 3\sqrt{10} = 30 \cdot 27 \cdot 10 = 8100.$$



$$SN = 6; SL = 6; AL = 14; AK = 14; A_1K = 16.$$

KK_1 — перпендикуляр к BC ,

$$KK_1 = KA_1 \cdot \sin(\angle AA_1B) = \frac{48}{5}$$

$$K_1N = KK_1 = \frac{48}{5}$$

Сфера \mathcal{D} вписана в двугранный угол при ребре BC , значит, $K_1N \perp BC$, и точки K, K_1, N, O (O — центр сферы) лежат в одной плоскости.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$a = \begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 2 & 3 & 5 \end{matrix}; \quad b = \begin{matrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ 2 & 3 & 5 \end{matrix}; \quad c = \begin{matrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \\ 2 & 3 & 5 \end{matrix}$

$$\begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 \geq 6 \\ \beta_1 + \gamma_1 \geq 14 \\ \gamma_1 + \alpha_1 \geq 16 \end{cases}$$

13

21

25



$2 \cdot (\beta_1 + \gamma_1) \geq 18$

$\geq 2 \cdot 9 = 18$

$4? \cdot 2? \cdot 12?$



~~9 5 16~~
9 5 17

~~15 13~~

10 arcsin(sin(x)) = 9π - 2x

$\arcsin(\sin(a)) + \arccos(\cos(a)) = \frac{\pi}{2}$

~~arcsin(x)~~ $\arccos(\sin(x)) =$




10 arcsin

$10\left(\frac{\pi}{2} - \arcsin(\sin(x))\right) = 9\pi - 2x$

$-10 \arcsin(x) = 4\pi - 2x$

$\arcsin(x) = \arctan\left(\frac{1}{5}x - \frac{2\pi}{5}\right)$

$5x + 6ay - b = 0$
 $x^2 + y^2 = 25$
 $x^2 + (y+9)^2 = 4$



$x = -\frac{6a}{5}y + \frac{b}{5}$

$5\pi - 5x = x - 2\pi; \quad 6x = 7\pi; \quad x = \frac{7}{6}\pi$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$(\log_{11}(x))^4 - 6 \log_x(11) = \log_{x^3}\left(\frac{1}{121}\right) - 5$$

$$(\log_{11}(x))^4 - 6 (\log_{11}(x))^{-1} = -2 \cdot (3 \log_{11}(x))^{-1} - 5$$

$$a^4 - \frac{6}{a} = -\frac{2}{3a} - 5 \quad | \cdot 3a$$

$$3a^5 - 18 + 2 + 15a = 0$$

$$3a^5 + 15a - 16 = 0$$

$$3a(a^4 + 5) = 16$$

возвращает

$$\frac{b}{3}$$

$$\log_{x^3}\left(\frac{1}{121}\right) =$$

$$\frac{\ln\left(\frac{1}{121}\right)}{\ln(x^3)}$$

$$= \frac{-2 \ln(11)}{3 \ln(x)} = -\frac{2}{3 \log_{11}(x)}$$

$$(\log_{11}(asy))^4 + \log_{asy}(11) = \log_{(asy)^3}(11^{-1}) - 5$$

$$(\log_{11}(asy))^4 + (\log_{11}(asy))^{-1} = -13 (\log_{11}(asy))^{-1} - 5$$

$$b^4 + \frac{1}{b} = -\frac{13}{3b} - 5 \quad | \cdot 3b$$

$$3b^5 + 1 + 14 + 15b = 0$$

$$3b^5 + 15b + 15 = 0$$

$$3b^5 + 15b + 15 = 0$$

$$3b^5 + 3 + 13 + 15b = 0$$

$$3b^5 + 15b + 16 = 0$$

$$3a^3b - 5a^2b^2 + 3ab^3$$

$$3(a^5 + b^5) + 15(a+b) = 29$$

$$3(a+b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4 + 15) = 29$$

$$3(a^5 + b^5) + 15(a+b) = 0$$

$$3(a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4 + 5) = 0$$

$$+ a^2b^2$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{array}{r} 118 \\ + \\ \hline 336 \end{array}$$



$$(x-R)^2 + (y-R)^2 = R^2$$


$$x=0; y = R \pm \sqrt{R^2 - 2}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}x; x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 + \frac{2}{5}x^2 - \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}Rx = 0;$$


$$\left(1 + \frac{2}{5}\right)x^2 + \left(-2\sqrt{2} - \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}R\right)x + 2 = 0$$

$$2x^2 - 2\sqrt{10}(\sqrt{5} + R)x + 10 = 0$$

$$x = \frac{2\sqrt{10}(\sqrt{5} + R) \pm \sqrt{40(\sqrt{5} + R)^2 - 40}}{4}$$




$$5\sqrt{2} - \sqrt{10}R - \sqrt{10R^2 + 100R + 180}$$



$$\frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\sqrt{5}$$



$$F = 0 \sqrt{14}$$

$$L = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$F = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$L = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

~~$a^5 + 5a + 5a^2 + 5a^3 + 5a^4 + 5a^5$~~



$6\Delta x + \Delta y = 48$

$\Delta y \in [-90; 90]$

$6x_1 + y_1 = 0$

$6x_1 + y_1 = 78$

$y_1 = -\frac{1}{6}(x_1 - 17)$

-7; 30

-6; 84

~~0; 48~~

8; 0

23; -90

$6x_2 + y_2 = 6x_1 + y_1 + 48$

$\begin{array}{r} x \quad 538 \\ \times \quad 7 \\ \hline 3766 \end{array}$

$\begin{array}{r} 64 \\ \times \quad 8 \\ \hline 512 \\ + \quad 90 \\ \hline 538 \end{array}$

Если Алехна ~~$y = -6x + c$~~

$y = -6(x - c)$

то Влехна ~~$y = -6x + (c + 48)$~~

$y = -6(x - (c + 8))$

$(-6x; -6(x - 8)) - 16^2$ вартов

$(-6(x - 9)) - 16^2$

$(14 - \sqrt{14}x)(-5) =$

$= (4 \pm 2\sqrt{5}x)(\frac{1}{5})$

$(-6(x - 7), -6(x - 17)) - 16^2$

$14 - \sqrt{14}x = 2\sqrt{5}x - 4;$

$x(\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{5}} - 2\sqrt{5}) = 18$

$x = \frac{9\sqrt{2}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} = \frac{9\sqrt{2}(\sqrt{4} + \sqrt{5})}{\sqrt{5} - \sqrt{5}}$